

Wskaźniki klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych¹⁾ i gleb w okresie sześciodekadowym od dnia 21 maja do dnia 20 lipca 2026 roku

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Województwo łódzkie

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana

Wyjaśnienia dotyczące kategorii gleb:

Zróżnicowanie przestrzenne pokrywy glebowej w Polsce według kategorii glebowych o różnej podatności na suszę – gleby bardzo lekkie (bardzo podatne), gleby lekkie (podatne), średnie (średnio podatne), ciężkie (mało podatne).

Kategorie gleb:

I - Bardzo lekka, grupa granulometryczna -	piasek luźny - pl piasek luźny pylasty - plp piasek słabo gliniasty - ps piasek słabo gliniasty pylasty - psp
II - Lekka, grupa granulometryczna -	piasek gliniasty lekki - pgl piasek gliniasty lekki pylasty - pglp piasek słabo gliniasty mocny - pgm piasek słabo gliniasty mocny pylasty - pgmp
III - Średnia, grupa granulometryczna -	głina lekka - gl głina lekka pylasta - glp pył gliniasty - plg pył zwykły - plz pył piaszczysty - plp
IV - Ciężka, grupa granulometryczna -	głina średnia - gs głina średnia pylasta - gap głina ciężka - gc głina ciężka pylasta - gcp pył ilasty - pli il - i ił pylasty - ip

Kategorie gleb ustala się w oparciu o skład granulometryczny profilu glebowego, według powyższych kryteriów podziału, na podstawie cyfrowych map glebowo-rolniczych przedstawiających przestrzenne zróżnicowanie siedlisk glebowych i ich pojemności wodnej.